Kaput® MOLE GEL BAIT

INSTRUCCIONES DE USO

Usar este producto de una manera distinta a la indicada en su etiqueta infringe la ley federal.
Aplique este producto solo en los lugares, plagas y métodos de aplicación especificados en esta etiqueta.

Lea esta etiqueta:
Lea toda esta etiqueta y siga todas las instrucciones y precauciones de uso.
IMPORTANTE: No exponga a niños, mascotas u otros animales no objetivo a raticidas. Para ayudar a prevenir accidentes:

1. Cuando no esté en uso, guarde el producto en lugares que estén lejos del alcance de los niños y las mascotas.
2. Siga todas las instrucciones de aplicación y las **restricciones de uso** de esta etiqueta. Aplique el cebo solo en las galerías subterráneas de los topos. Mantenga a las mascotas lejos de las áreas tratadas y aísle las áreas tratadas con cercas existentes, en caso de haberlas.
3. Deseche el envase del producto y el cebo sin usar o en mal estado como se especifica en esta etiqueta.

Restricciones de uso: Este producto puede usarse únicamente para controlar topos orientales *(Scalopus aquaticus)*, topos de nariz estrellada* *(Condylura cristata)*, topos de cola peluda *(Parascalops breweri)*, topos costeros *(Scapanus orarius)*, topos de patas anchas *(S. latimanus)* y/o topos de Townsend *(S. townsendii)* en césped, áreas de pasto, campos de golf y otras áreas de pasto no destinadas a alimentos. Este producto solo se puede aplicar en los lugares de uso y mediante los métodos de aplicación indicados en esta etiqueta. El cebo debe aplicarse directamente en los sistemas de madrigueras de los topos (túnel subterráneo principal o pistas subterráneas). No coloque el cebo en la superficie del suelo.
***No debe usarse contra los topos de nariz estrellada en Carolina del Norte.**
Selección de las áreas de tratamiento: La presencia de topos puede manifestarse a través de una red de crestas superficiales en el césped o por una serie de montículos cónicos de tierra empujados hacia arriba desde madrigueras profundas. Los montículos cónicos pueden delatar la ubicación de las principales pistas subterráneas.
Colocación de cebos: Antes del tratamiento, determine cuáles son los sistemas de madrigueras activos. Con una varilla de madera de extremo redondo, como un palo de escoba, sondee el terreno en las proximidades de montículos cónicos o crestas superficiales hasta que se detecte el pasadizo subterráneo principal por una disminución repentina de la resistencia contra la sonda. Marque los sistemas de madrigueras abiertas y vuelva a revisarlos 2-3 días después. En túneles más profundos, abra el sistema con una pala y déjelo abierto. Es probable que los topos vuelvan a tapar los sistemas de madrigueras activos.
Trate solo los sistemas de madrigueras activos. Para tratar un sistema de madrigueras, localice los pasadizos principales mediante sondeo. Retire la tapa de la punta de la jeringa aplicadora y gire el anillo dosificador hasta la marca que indica media onza (14,5 ml). Inyecte media onza (14,5 ml) de cebo (un sexto del contenido de una jeringa) a través de una sonda o un agujero abierto con pala en cada ubicación de colocación de cebo. Realice seis (6) aplicaciones de este tipo por sistema de madrigueras. Cubra los agujeros hechos para ingresar al túnel con césped y tierra, pero no permita que la tierra se filtre para no ensuciar o cubrir el cebo.
Seguimiento: Verifique los efectos del tratamiento 4-5 días después de la aplicación del cebo abriendo y marcando las madrigueras de la manera utilizada para verificar la actividad inicial. Regrese 2-3 días después y trate nuevamente todas las madrigueras activas. La proporción máxima de aplicación es 1 jeringa/10 000 pies cuadrados (929 metros cuadrados).

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine el agua, los alimentos o los piensos mediante el almacenamiento o la eliminación.
Almacenamiento de pesticidas: Almacene en el envase original en un lugar fresco y seco inaccesible para niños y mascotas. No guarde jeringas usadas o parcialmente usadas. **Desecho de los pesticidas**: Los desechos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en el sitio o en una instalación aprobada para la eliminación de desechos. **Manipulación de envases:** Envase no rellenable; no reutilice ni rellene este envase. Ofrézcalo para reciclaje, si es posible; de lo contrario, deseche el envase vacío en un relleno sanitario o por incineración.

Número de lote: *Revise el fondo del envase*

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
Peligros para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN: Es dañino si se ingiere. Mantenga alejado de los niños, animales domésticos y mascotas. Todas las personas que manipulen los cebos o recuperen cadáveres deben usar guantes. Lávese bien con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar chicle o consumir tabaco.

PRIMEROS AUXILIOS TENGA A MANO LA ETIQUETA AL MOMENTO DE RECIBIR ASESORAMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO	
Si se ingiere	• Llame de inmediato a un centro de toxicología, a un médico o a la Red Nacional de Información sobre Pesticidas (1-800-858-7378) para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. • Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. • No induzca el vómito a menos que se lo indique el centro de toxicología o el médico.

TRATAMIENTO PARA EL ENVENENAMIENTO DE MASCOTAS
Si el animal se come el cebo, llame de inmediato a un veterinario o al 1-800-222-1222.

NOTA PARA EL MÉDICO O EL VETERINARIO:
Contiene el anticoagulante warfarina. Si se ingiere, dicho material puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y causar sangrado. En caso de que seres humanos o animales ingieran el cebo y/o muestran signos de envenenamiento (sangrado o tiempos elevados de protrombina), administre vitamina K1 por vía oral o intramuscular.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los mamíferos y las aves. Los perros, los gatos y otros mamíferos y aves depredadores y carroñeros podrían envenenarse si se alimentan de animales que comieron este cebo. No aplique directamente al agua.

GARANTÍA

En la medida en que sea coherente con la ley aplicable, el Fabricante y el Vendedor no ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto al uso de este producto que no sea el indicado en la etiqueta. El Comprador asume todos los riesgos de uso y/o manipulación de este material cuando dicho uso y/o manipulación no sea el indicado en las instrucciones de la etiqueta.

Aviso: Este producto contiene una sustancia química que, según el estado de California, causa defectos congénitos u otros daños reproductivos.

Kaput® MOLE GEL BAIT
Cebo en gel diseñado para imitar la fuente de alimento natural de los topos

MATA A LOS TOPOS

Kaput®
MOLE GEL BAIT

ESTE PRODUCTO SOLO SE PUEDE UTILIZAR PARA CONTROLAR A LOS TOPOS EN APLICACIONES MANUALES Y SUBTERRÁNEAS.

PESO NETO. 3 ONZAS LÍQUIDAS (84 g)

Scimetrics LTD. CORP.
New Solutions to Old Problems
P.O. Box 1045 Wellington, CO 80549
(970) 482-1330 mole@scimetricsltd.com
Versión 07/21/15

INGREDIENTE ACTIVO:
Warfarina (número CAS 81-81-2) 0,025%
OTROS INGREDIENTES 99,975%
TOTAL 100,000%

N.º de registro de la EPA 72500-2 **EPA Est. 72500-CO-1**

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
Consulte el panel posterior para obtener declaraciones de precaución adicionales.

Kaput® MOLE GEL BAIT
Cebo en gel diseñado para imitar la fuente de alimento natural de los topos

8 53215 00003 3